

TRAUMATISME CRANIONCEFÀLIC

QUÈ ÉS UN TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC?

És tot aquell traumatisme al cap. Un cop ha estat valorat pels professionals de pediatria i confirmada una exploració neurològica normal, no necessita ingrés ni proves complementàries però és necessària una observació domiciliària

QUÈ CAL FER A CASA?

- Observeu el nen durant les 24 hores següents per si apareix algun problema.
- Si el nen té son pot deixar-lo dormir, però despertant-lo cada 2-3 hores, aproximadament, per observar-ne les reaccions. Heu de mantenir un comportament adequat.
- Si presenta mal de cap, pot prendre paracetamol o ibuprofè a dosis habituals.
- A les 24 hores del traumatisme es pot reiniciar el ritme normal de vida.

QUAN HA DE CONSULTAR DE NOU EN UN SERVEI D'URGÈNCIES?

- Si el/la nen/a vomita repetidament.
- Si presenta mal de cap intens o progressiu.
- Si el seu fill/a està confós, somnolent, irritable o costa molt despertar-lo.

- Si l'infant comença amb moviments anormals, debilitat o formigueig d'extremitats, té dificultat per caminar, parla o veu malament o té les pupil·les de mida diferent.



- Si observeu sortida de líquid clar o sang pel nas o les orelles.
- En general, qualsevol símptoma que us resulti estrany o us preocupi.

QÜESTIONS IMPORTANTS

- La majoria dels traumatismes al cap són lleus i no produeixen danys. Amb cops mínims és molt estrany que es produeixin lesions. Són, però, traumatismes de risc els que es produeixen a la regió occipital o per caigudes des d'una alçada superior a 1,5 vegades l'alçada de l'infant.
- És normal que a les primeres hores el seu fill estigui espantat, no recordi el moment del traumatisme, tingui mal de cap o presenti algun vòmit.
- En la majoria dels casos no cal fer cap prova d'imatge.